Les règles du
PATURAGE TOURNANT


BIO BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

1. Une surface de pâturage en adéquation avec le potentiel de mes parcelles, la taille du lot et la saison de pâturage

Chargement moyen possible	au printemps	à l'été / automne	en hiver
Prairie à faible potentiel (< 5 tMS/ha)	2 UGB /ha	1 UGB / ha	0,5 UGB /ha
Prairie à fort potentiel (> 6 tMS/ha)	3 UGB /ha	1,5 UGB /ha	0,8 UGB /ha

2. Les chiffres à respecter pour organiser les rotations entres les paddocks

Je pilote mes entrées et sorties de paddocks à la hauteur d'herbe de là où je me situe



10
UGB / ha minimum
de chargement instantané

6
Paddocks minimum

7
Jours maximum sur le même paddock, pour ne pas manger les repousses

21 **Jours minimum avant de retourner sur le paddock**


Pour le développement des légumineuses il faut compter **35** jours de retour

Et **56** pour limiter le risque lié aux strongles

3. L'organisation de la rotation

1 **Déprimage ou fauche de la surface complémentaire pour créer un décalage**

2 **Paturage de la surface de base jusqu'au ralentissement de la pousse de l'herbe**



3 **Quand l'herbe ralentit sa croissance et après minimum 6 semaines de repousses, je repasse sur la surface complémentaire pour diminuer mon chargement moyen et garantir un temps de retour suffisamment long**

Surface complémentaire : Pâturée et fauchée

Surface de base : Exclusivement pâturée

Pendant ma saison de pâturage tournant, que faire ? si...

Je ne sais pas quand sortir mes animaux : Je surveille les indicateurs de degrés jours afin de sortir au bon moment, si la portance de mon sol le permet.
Mise à l'herbe : en ovin à 200°CJ, en bovin à 350°CJ / **Fin du 1er cycle** à 750°CJ

Je n'arrive pas à suivre la pousse de l'herbe au printemps : Je saute une parcelle, que je laisse pousser pour qu'elle soit utilisée en stock sur pied, si possible au fil avant, pendant les moments de stress hydrique.

La pousse de l'herbe est trop faible pendant l'été : Je stoppe mon lot dans une parcelle que j'affourage jusqu'à ce que la pousse de l'herbe ait suffisamment repris, on l'appelle une parcelle parking.

J'observe beaucoup de refus dans mes paddocks pâturés : Cela signifie que le chargement est trop faible. Je peux augmenter le nombre d'animaux dans le lot ou diminuer la taille de mes paddocks.

Le sol de mes parcelles se détériore : Le paturage est trop dynamique par rapport à la portance. J'agrandis mes paddocks ou je diminue mon nombre d'animaux dans le lot. Et/ou la date de sortie est trop précoce en saison. Je déprime la zone complémentaire en premier afin de créer un escalier de la pousse de l'herbe, ou je sors progressivement mes animaux afin de diminuer le chargement en début de saison.

A prendre en compte pour la réussite de son paturage tournant :


L'accès à **l'eau** à chaque paddock.


Une découpe réfléchie, qui prend en compte les limites du milieu et des besoins des animaux.


Les **clôtures** fixes ou mobiles.


Un **calendrier / plan de rotation** entre les paddocks


Le suivi de la **pousse de l'herbe.**

Liens vers les outils pour la réussite du paturage tournant

BIO BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté
Égalité
Fraternité